Abdominal pain



หมายเหตุ : ปวดท้อง Epigastrium **ที่รักษาตามอาการ ไม่ดีขึ้น ให้นึกถึง** Acute coronary syndrome (MI)


RUQ
อืด แน่น แสบ ± คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดมาก มักมีคลื่นไส้ อาเจียน ± มีไข้
ไข้ หนาวสั่น เหลือง
not tender , no guarding
mark tender at RUQ(murphy sign +ve) ± ไข้ ± icteric sclera
icteric sclera , tender RUQ Fever " Charcot's triad "
Dyspepsia
Cholecystitis
Cholangitis
รักษาตามอาการ
ไม่ดีขึ้น
รายงานแพทย์


RLQ
ปวดตลอด
± คลื่นไส้ อาเจียน
เบื่ออาหาร ,ไข้
ปวดมาก ร้าวทะลุ
หลัง ไม่มีท่าทางที่ทำ
ให้ดีขึ้น, ± ปัสสาวะ
ประวัติประจำเดือนขาด ,
UPT +ve , ± shock ±
เลือดออกทางช่องคลอด
ตกขาว ± ไข้
tender at RLQ(Mc
burney) ,rebound +ve
ไม่ชัดเจน หรือ ปกติ
tender at lower
abdomen or RLQ
±guarding / Rebound
tender at lower
abdomen or RLQ
Appendicitis
Rt UC
Ectopic Pregnancy
PID
รายงานแพทย์


LLQ
Pelvic / lower abdomen
ปวดมาก ร้าวทะลุหลัง
ไม่มีท่าทางที่ทำให้ดีขึ้น,
± ปัสสาวะ
ประวัติ
ประจำเดือนขาด ,
UPT +ve , ± shock
± เลือดออกทาง
ตกขาว ± ไข้
ปัสสาวะแสบขัด
กะปริบกะปรอย
± ปัสสาวะปนเลือด
ไม่ชัดเจน หรือ ปกติ
± tender at pelvic area
tender at lower
abdomen or LLQ
± Guarding /Rebound
tender at lower
abdomen or LLQ
ถ้ามีไข้สูง หนาวสั่น
CVA tender
Cystitis
Lt UC
Ectopic Pregnancy
PID
Pyelonephritis
รักษาตามอาการ
HM: Norfloxacin / Ofloxacin
ไม่ดีขึ้น
รายงานแพทย์


ปวดทั่วท้อง
แน่น อืดท้อง ไม่มีไข้ ปัสสาวะ อุจจาระ ปกติ
ถ่ายเหลว ±คลื่นไส้ อาเจียน
ไม่ถ่ายอุจจาระ ไม่ผายลม ท้องอืด กิน แล้วอาเจียน ±เคย ผ่าตัดช่องท้อง
ปวดมาก ยิ่งขยับยิ่งปวด ± มีไข้
Soft , Distend Mild tender
Soft , Mild tender
Marked distend Mild tender
Guarding ,Marked tender Rebound +pv
Dyspepsia
AGE
Gut obstruction (เพศชาย ถ้ามีก้อนที่ขาหนีบด้วย อาจเป็น incarcerated herria)
Peritonitis
รักษาตามอาการ
ไม่ดีขึ้น
รายงานแพทย์